



INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

- A prova consta de 40 (QUARENTA) questões, todas de múltipla escolha, com alternativas "A, B, C, D".
- Você receberá um gabarito cujo formato consta 50 (cinquenta) questões com alternativas "A, B, C, D, E".
- **Desprezar a letra "E" e as questões de 41 a 50.**
- Para cada questão existe apenas uma alternativa correta.
- A prova terá duração de 180 (Cento e Oitenta) minutos. Você será avisado quando restarem 30 minutos para o final.
- Tenha em mãos apenas o material necessário para a resolução da prova. Não é permitido o uso de calculadoras nem o empréstimo de qualquer tipo de material.
- Utilize as partes em branco do "Caderno de Questões" como rascunho.
- **ATENÇÃO:** só existe 01 (uma) alternativa correta.
- Preencher o quadrado com caneta PRETA ou AZUL de ponta grossa. **Importante, o preenchimento deverá ser feito cuidadosamente sem sair do quadrado.**
- **Assine o CARTÃO-RESPOSTA no local indicado. Sem a assinatura seu cartão é invalidado.**
- A apuração do resultado será feita por leitora óptica, não havendo processamento manual dos cartões, portanto não cometa erros no seu gabarito.
- **Anular-se-á, automaticamente, questões que contiver no Gabarito, rasuras, duas respostas ou em branco.**
- NÃO há outros cartões de resposta para substituir os errados, portanto, atenção.
- Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala para entrega simultânea do CARTÃO-RESPOSTA e assinar na folha de ocorrência.

AQUI ESTÃO SEUS DADOS
 CADASTRAIS.

VERIFIQUE SE ESTÁ TUDO CERTO.

INSCRIÇÃO Nº	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
PROVA																									

NÃO USE, NEM
 ESCREVA NESSA
 PARTE. CASO
 FAÇA, SEU
 GABARITO SERÁ
 INVALIDADO.

PREENCHA AS
 RESPOSTAS
 ASSIM.

01	A	B	C	D	E	26	A	B	C	D	E
02	A	B	C	D	E	27	A	B	C	D	E
03	A	B	C	D	E	28	A	B	C	D	E
04	A	B	C	D	E	29	A	B	C	D	E
05	A	B	C	D	E	30	A	B	C	D	E
06	A	B	C	D	E	31	A	B	C	D	E
07	A	B	C	D	E	32	A	B	C	D	E
08	A	B	C	D	E	33	A	B	C	D	E
09	A	B	C	D	E	34	A	B	C	D	E
10	A	B	C	D	E	35	A	B	C	D	E
11	A	B	C	D	E	36	A	B	C	D	E
12	A	B	C	D	E	37	A	B	C	D	E
13	A	B	C	D	E	38	A	B	C	D	E
14	A	B	C	D	E	39	A	B	C	D	E
15	A	B	C	D	E	40	A	B	C	D	E
16	A	B	C	D	E	41	A	B	C	D	E
17	A	B	C	D	E	42	A	B	C	D	E
18	A	B	C	D	E	43	A	B	C	D	E
19	A	B	C	D	E	44	A	B	C	D	E
20	A	B	C	D	E	45	A	B	C	D	E
21	A	B	C	D	E	46	A	B	C	D	E
22	A	B	C	D	E	47	A	B	C	D	E
23	A	B	C	D	E	48	A	B	C	D	E
24	A	B	C	D	E	49	A	B	C	D	E
25	A	B	C	D	E	50	A	B	C	D	E



www.institutojkm.org

UTILIZE ESFEROGRÁFICA AZUL PONTA GROSSA
 INSTRUÇÕES PARA MARCAÇÃO

MARQUE ASSIM:



NÃO MARQUE ASSIM:



ASSINATURA

ASSINE SEU
 CARTÃO-RESPOSTA
 AQUI PARA
 VALIDÁ-LO E NÃO
 SER ELIMINADO.

OBSERVE COMO SE DEVE PREENCHER O
 CARTÃO DE RESPOSTA

NOME _____ INSCRIÇÃO Nº _____



LÍNGUA PORTUGUESA

01. TEXTO I

"Os gêneros textuais são formas de comunicação escrita ou verbal que possuem características específicas e são utilizados para diferentes propósitos. São estratégias de linguagem que permitem aos indivíduos expressar ideias, opiniões e sentimentos de maneira eficaz. Desde relatos históricos até obras literárias, os gêneros textuais desempenham um papel fundamental na construção da nossa cultura e na forma como nos relacionamos com o mundo ao nosso redor. Neste conteúdo, exploraremos os principais gêneros textuais, suas características e funcionalidades, para entender melhor como eles moldam nossa comunicação e expressão."

TEXTO II

Resiliência (s.f.)

Habilidade que uma pessoa desenvolve para resistir, lidar e reagir de modo positivo em situações adversas.

Com base nas informações do Texto I e na análise detalhada do Texto II, é correto afirmar que a tipologia deste último pertence ao gênero:

- a) Científico
- b) Argumentativo
- c) Injuntivo-instrucional
- d) Expositivo

Texto para as questões 2, 3 e 4:

Poema da purificação

Depois de tantos combates
o anjo bom matou o anjo mau
e jogou seu corpo no rio.
As água ficaram tintas
de um sangue que não descorava
e os peixes todos morreram.
Mas uma luz que ninguém soube
dizer de onde tinha vindo
apareceu para clarear o mundo,
e outro anjo pensou a ferida
do anjo batalhador.

(Carlos Drummond de Andrade)



02. No poema de Carlos Drummond de Andrade, no verso 3 identifica-se uma oração:

- a) Absoluta.
- b) Subordinada em relação à anterior.
- c) Coordenada, apresentando uma relação semântica de soma com a oração anterior.
- d) Mista, apresentando relações de subordinação e de independência sintática com outras orações.

03. No poema, aparecem duas ocorrências da palavra QUE. É correto afirmar quanto a elas que:

- a) Na 1ª ocorrência é uma conjunção coordenativa explicativa e na 2ª, é uma conjunção subordinativa integrante.
- b) Na 1ª ocorrência é um pronome relativo e na 2ª, é uma conjunção subordinativa integrante.
- c) Nas duas ocorrências elas correspondem a elementos remissivos, portanto são classificadas como pronomes relativos.
- d) Nas duas ocorrências elas introduzem orações subordinadas substantivas, portanto são conjunções subordinativas integrantes.

04. Dentre as figuras de linguagem mencionadas abaixo, apenas uma é claramente perceptível no verso 2 do poema: "O anjo bom matou o anjo mau" – Assinale-a:

- a) Paradoxo
- b) Perífrase
- c) Ironia
- d) Apóstrofe

05. Dadas as frases:

- I. A reivindicação aconteceu no mercado municipal da cidade.
- II. Deu Ana um belo presente a seu filho.
- III. Revelou o pai a verdade a todos os seus filhos.

As funções sintáticas exercidas pelos termos sublinhados são, respectivamente:

- a) Adjunto Adverbial/ Objeto Indireto/ Sujeito.
- b) Adjunto adverbial/ Sujeito/ Objeto Direto.
- c) Adjunto Adnominal/ Objeto Direto/ Sujeito.
- d) Adjunto Adverbial/ Sujeito/ Sujeito.

06. Leia as frases:

- I. Só exijo de você isso: que me apoie nesse meu novo projeto.
- II. Todo alimento que é fresco, é mais nutritivo.



As orações introduzidas pela palavra **QUE** são, respectivamente:

- Subordinada Substantiva e Subordinada Adjetiva.
- Subordinada Adjetiva e Subordinada Substantiva.
- Ambas são Subordinadas Adjetivas.
- Coordenada Sindética Explicativa e Subordinada Adjetiva.

07. Observe:



No anúncio acima, os termos presentes dentro do círculo são **ADJETIVOS** apresentando o grau:

- Comparativo de Superioridade.
- Superlativo Relativo de Superioridade.
- Superlativo Absoluto Sintético.
- Superlativo Absoluto Analítico.

Leia o texto e responda as questões 8, 9 e 10.

O pavão

Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta, como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Eu considerei que este é o luxo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz ele faz seu esplendor; seu grande mistério é a simplicidade.

Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.

Rubem Braga

08. Em “**Considerei, por fim, que assim é o amor, oh! minha amada; de tudo que ele suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico.**”, os termos destacados são, respectivamente:

- Conjunção integrante e pronome relativo.
- Pronome relativo e conjunção integrante.
- Pronome relativo e conjunção consecutiva.
- Conjunção integrante e conjunção integrante.

09. No trecho destacado no fragmento “... de tudo que ele **suscita e esplende e estremece e delira em mim existem apenas meus olhos recebendo a luz de teu olhar.**”, há exemplo de:

- Gradação e polissíndeto.
- Metonímia e assíndeto.
- Aliteração e pleonasma.
- Metáfora e assíndeto.

10. Sobre o trecho “**Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores; é um luxo imperial. Mas andei lendo livros; e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos.**”, é correto afirmar que:

- Há falha de concordância verbal no último período.
- Uso do primeiro ponto e vírgula está inadequado, devendo ser substituído por um ponto.
- O verbo *considerar*, no contexto, exige duplo complemento: um sem preposição e outro com preposição.
- A correção gramatical seria mantida ao substituir “*existem*” por “*há*”, apesar de alterações sintáticas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11. **Cinco amigos, Fábio, Gustavo, Henrique, Igor e João, estão discutindo suas cores favoritas. Eles têm as seguintes preferências:**

- Fábio não gosta de azul nem de vermelho.
- Gustavo gosta de verde.
- Henrique não gosta de amarelo.
- Igor não gosta de vermelho nem de verde.

Qual é a cor favorita de João?

- Azul
- Amarelo
- Verde
- Vermelho



12. Em uma competição de quebra-cabeças, os cinco competidores, Lucas, Mariana, Felipe, Ana e João, completaram suas tarefas em diferentes tempos: 15, 20, 25, 30 e 35 minutos. Sabemos que:

- Lucas terminou antes de Felipe.
- Mariana terminou após João, mas antes de Ana.
- Felipe levou mais tempo que Lucas, mas menos que Ana.

Quem completou o quebra-cabeça em 30 minutos?

- a) João
- b) Mariana
- c) Ana
- d) Felipe

13. O sonho de riqueza leva homens às profundezas da terra. Em busca de pedras preciosas, garimpeiros brasileiros descobriram a que pode ser a maior esmeralda do planeta. A esmeralda, encontrada há 12 anos em Pindobaçu, cerca de 370 quilômetros de Salvador, foi parar nos Estados Unidos. E a disputa para decidir quem tem direito à pedra de R\$ 1 bilhão continua até hoje. A pedra pesando quase 400 kg era tão grande que os garimpeiros que a encontraram não conseguiram calcular o valor exato. Sabendo que 1 (um) quilate de pedras preciosas, equivale a massa de 200 miligramas. Eles tinham apenas uma certeza: estavam diante de uma fortuna. Ela recebeu o apelido de “Esmeralda Bahia”.

Fonte : <https://clickpetroleoegas.com.br> >

Qual é a massa em quilates da Esmeralda Bahia?

- a) $8 \cdot 10^2$ quilates.
- b) $8 \cdot 10^3$ quilates.
- c) $8 \cdot 10^4$ quilates.
- d) $8 \cdot 10^5$ quilates.

14. O perímetro da base de um tanque na forma de um paralelepípedo retângulo é 16m, uma de suas dimensões é o quádruplo da outra. Calcule o volume do tanque em litros, sabendo que a sua profundidade é 6m.

- a) 64.540 litros
- b) 64.440 litros
- c) 64.000 litros
- d) 64.400 litros

15. A afirmação "Se estiver chovendo, eu não sairei de casa" é verdadeira. Qual é a negação correta dessa afirmação?

- a) Está chovendo e eu não sairei de casa.
- b) Está chovendo e eu sairei de casa.
- c) Não está chovendo e eu sairei de casa.
- d) Não está chovendo e eu não sairei de casa.

INFORMÁTICA

16. A conexão wireless é um avanço da tecnologia que facilita a comunicação entre dispositivos. Não é considerada uma conexão wireless:

- a) Wi-Fi
- b) Bluetooth
- c) 5G
- d) Ethernet

17. Assinale o aplicativo que NÃO representa uma opção de ferramenta para backup:

- a) One Drive
- b) Dropbox
- c) Kobo
- d) Google Drive

18. Qual é a função das “regras de entrada e saída” do Firewall do Windows?

- a) Garantir a permissão de qualquer tipo de tráfego com acesso à internet.
- b) Bloquear o acesso de qualquer tipo de tráfego.
- c) Melhorar a qualidade de conexão com a internet.
- d) Controlam o tráfego de rede, permitindo ou bloqueando acessos através do Firewall.

19. Qual das seguintes opções NÃO é uma configuração de inicialização do sistema operacional Windows?

- a) Habilitar o modo seguro.
- b) Habilitar o modo kernel.
- c) Habilitar vídeo de baixa resolução.
- d) Habilitar a depuração.

20. No navegador Microsoft Edge, o “Kit de ferramentas de aprendizagem” apresenta em seu menu as seguintes ferramentas:

- a) Microsoft 365, Solucionador Matemático, Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- b) Solucionador Matemático, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- c) Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.
- d) Microsoft 365, Leitor de PDF, Leitor Imersivo, Ler em voz alta.



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A Periodontite consiste em uma doença inflamatória crônica multifatorial associada com biofilme disbiótico e caracterizada pela destruição progressiva do aparato de inserção dental. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que NÃO condiz com as características clínicas da doença periodontal supracitada.

- a) Presença de sítios com profundidade de sondagem de até 3 mm, 10% ou mais dos sítios com sangramento à sondagem, perda de inserção e possível perda óssea radiográfica.
- b) Perda de inserção detectada em dois ou mais sítios interproximais não adjacentes.
- c) Lesão endoperiodontal drenando por meio do periodonto marginal.
- d) Cárie dental estendendo até a área cervical do dente.

22. De acordo com a nova classificação da periodontite, marque a alternativa correta.

- I. Os estágios da periodontite dizem respeito à extensão da doença, que podem ser localizada até 30% dos dentes afetados), generalizada (maior ou igual a 30% dos dentes afetados) e padrão molar/incisivo (quando somente esses são atingidos).
 - II. É classificada em ESTÁGIO I,II,III e IV e em GRAU A,B ou C, podendo este último ser modificado por fatores de riscos como tabagismo ou diabetes mellitus.
 - III. No ESTÁGIO I, como característica determinante encontramos 1-2 mm de perda de inserção interproximal e profundidade de sondagem de até 5 mm, sem perda dental devido à periodontite, como características secundárias.
 - IV. No Grau C acontece uma progressão rápida com evidência direta, igual ou superior a 2mm em 5 anos ou indireta de perda óssea/ano superior a 1 mm.
- a) I, II e IV
 - b) II e IV
 - c) I e IV
 - d) II e III

23. Paciente hipertenso, portador de insuficiência cardíaca, compareceu ao consultório odontológico para cirurgia de implantes dentários para reabilitação total da arcada superior (protocolo Branemark). Ao exame de imagem observou-se presença satisfatória de altura e espessura óssea. O anestésico de escolha foi a prilocaína devido tempo de duração maior. Após administração do anestésico, o paciente se apresentou letárgico, com os leitos ungueais e as mucosas

cianóticas, com dificuldade respiratória e a pele em tom cinza pálido. A partir desses sinais clínicos, pode-se afirmar que o paciente teve uma reação adversa de:

- a) Lipotímia
- b) Hipersensibilidade mediada por IgE
- c) Metahemoglobinemia
- d) Superdosagem

24. Sabe-se que a endocardite bacteriana é um processo infeccioso em que as bactérias, através da corrente sanguínea, chegam e se alojam na superfície do endocárdio e nas válvulas cardíacas. Antes da implantação dos antibióticos, essa infecção era considerada fatal. Dessa forma, assinale a alternativa correta sobre o protocolo profilático recomendado pela AHA (American Heart Association):

- I. Dose única de amoxicilina 1g, 1 hora antes do procedimento cirúrgico por via oral. Para pacientes alérgicos às penicilinas, administrar cefalexina 2g por via oral.
 - II. Dose única de amoxicilina 2 gramas 1 hora antes do procedimento cirúrgico por via oral. Para pacientes alérgicos às penicilinas, azitromicina 500mg, 1 hora antes do procedimento, por via oral.
 - III. Dose única de amoxicilina 2 gramas 1 hora antes do procedimento cirúrgico por via oral. Para pacientes alérgicos às penicilinas, administrar cefalexina 2g, 1 hora antes do procedimento, por via oral.
 - IV. Dose única de amoxicilina 2 gramas 1 hora antes do procedimento cirúrgico por via oral. Para pacientes alérgicos às penicilinas, azitromicina 1g, 1 hora antes do procedimento, por via oral.
- a) I e IV
 - b) I e III
 - c) II e III
 - d) III e IV

25. Paciente compareceu ao consultório odontológico, queixando-se de dor em dente 47, sem dentes adjacentes. Ao exame clínico notou-se inflamação dos tecidos gengivais, bolsa periodontal de 4mm, elevação ovoide da gengiva na parede lateral da raiz, sangramento à sondagem com presença de exsudato purulento e mobilidade dentária, sem alterações no teste de vitalidade e de percussão horizontal e vertical. Ao exame de imagem, notou-se espessamento do espaço periodontal. Pode-se afirmar que o diagnóstico correto para o quadro clínico acima é de:

- a) Lesão endoperiodontal.
- b) Gengivite Induzida pelo Biofilme.
- c) Abscesso periodontal.
- d) Lesão endoperiodontal e Abscesso periodontal.



26. Sobre as reações adversas dos anestésicos locais, em pacientes gestantes, podemos afirmar:

- a) A felipressina é o vasoconstritor mais indicado em pacientes grávidas por ser derivada da vasopressina.
- b) Uso dos vasoconstritores em gestantes devem ser evitados. Anestésicos sem vasoconstritores são mais eficazes, além de seu efeito passar mais lentamente.
- c) Prilocaína e articaína não devem ser usadas pois podem levar à metahemoglobinemia, tanto na mãe quanto no feto.
- d) A bupivacaína apresenta a menor cardiotoxicidade.

27. Diariamente os dentistas se deparam com casos de dor no consultório, sendo os analgésicos os principais medicamentos para alívio dos casos. Conhecer a ação e interação medicamentosa desses medicamentos é de grande importância para o profissional. Dessa forma, marque a alternativa correta:

- I. A dipirona é um derivado das pirazonas e possui a capacidade de inibir funcionalmente a COX-1 e a COX-2.
 - II. A interação do paracetamol com a varfarina, em pacientes em tratamento com essa droga, pode resultar em hemorragias.
 - III. A dipirona pode interagir com álcool, potencializando a ação deste, não devendo, portanto, ser administrada concomitantemente com bebidas alcoólicas.
- a) I e III
 - b) I e II
 - c) II e III
 - d) I, II e III

28. Os AINES são geralmente prescritos na clínica odontológica em função de seus efeitos analgésico, antipirético e anti-inflamatório, agindo através da inativação de isoenzimas: as COX. É correto afirmar que:

- a) A inativação da COX pode ser, apenas, nas formas semi-seletivas (duas ou três vezes mais seletivo no bloqueio de COX-2 que de COX-1) ou altamente inibidora seletiva de COX-2 (sete vezes mais seletivos no bloqueio da atividade da COX-2).
- b) No organismo humano, a COX-1 (induzida) tem função hemostática que inclui a manutenção da mucosa gástrica, enquanto que a COX-2 (constitucional) está relacionada com inflamação e febre
- c) As atividades dos AINES ocorrem sobretudo pela ação inibitória sobre a COX-1, à medida que os efeitos colaterais são principalmente o resultado da inibição da COX-2.
- d) Todas alternativas estão incorretas.

29. Os antibacterianos de escolha na odontologia para tratamento de infecções odontogênicas em pacientes com quadro de alergia à penicilina são:

- a) Clindamicina e Amoxicilina.
- b) Azitromicina e Clindamicina.
- c) Metronidazol e Azitromicina.
- d) Amoxicilina e Azitromicina.

30. Em pacientes periodontalmente comprometidos, além da prática clínica com raspagem e alisamento radicular, o antibiótico que possui alta atividade contra anaeróbios mostrando-se eficaz no tratamento da periodontite avançada devido seus níveis no fluido gengival serem levemente maiores do que os encontrados no soro sanguíneo, resultando em concentrações letais para muitas bactérias do biofilme é:

- a) Azitromicina
- b) Cefalexina
- c) Clindamicina
- d) Metronidazol

31. A endocardite bacteriana é um processo infeccioso em que as bactérias se utilizam da corrente sanguínea para chegarem e se alojarem na superfície do endocárdio e nas válvulas cardíacas. Em quais tratamentos odontológicos são indicados o uso de profilaxia antibiótica afim de, evitar infecção por endocardite bacteriana?

- a) Extrações múltiplas, profilaxia, tratamento de canal.
- b) Raspagem subgengival, restauração extensa dos terceiros molares e exodontia simples.
- c) Raspagem periodontal, extrações múltiplas e simples, anestesia intraligamentar.
- d) Nenhuma das alternativas.

32. Paciente, sexo feminino, 20 anos, compareceu ao consultório odontológico para remoção do dente 48, incluso e impactado. De acordo com as técnicas cirúrgicas para remoção do terceiro molar inferior impactado, qual a sequênquia cirúrgica ideal para que não haja lesão ao nervo alveolar inferior (NAI) e nervo lingual (NL)?

- a) Anestesia do NAI, incisar e rebater retalho da região cirúrgica, ostectomia a partir do plano oclusal até a junção cimento-esmalte sendo o mais conservador no lado distal e distal-lingual para não envolver o NAI e o NL, além de odontoseção e em ambos usando brocas redondas de carboneto de tungstênio e peça de mão de baixa velocidade sob abundante irrigação.



- b) Anestesia do NAI, incisar e rebater retalho da região cirurgica, realizar ostectomia a partir da junção cimento-esmalte sendo mais conservador no lado mesial e mesio-lingual para não envolver o NAI e NL, além de odontosecção utilizando brocas redontas de caroneto de tungstênio e peça de mão de baixa rotação sob irrigação constante.
- c) Anestesia local do dente 48, incisar e rebater retalho da região cirurgica realizar ostectomia a partir da junção cimento-esmalte sendo mais conservador no lado mesial e mesio-lingual para não envolver o NAI e NL, além de odontosecção utilizando brocas redontas de caroneto de tungstênio e peça de mão de alta rotação sob irrigação constante.
- d) Anestesia do NAI, incisar e rebater retalho da região cirurgica, ostectomia a partir do plano oclusal até a junção cimento-esmalte sendo o mais conservador no lado distal e distal-lingual para não envolver o NAI e o NL e logo após inciar a luxação das paredes alveolares com forceps 18R.

33. Sobre o processo de reparação de alvéolos após extração dentária, podemos afirmar:

- I. A cicatrização ocorre por segunda intenção e após 24 horas da extração do dente, o alvéolo encontra-se preenchido por tecido de granulação.
- II. A cicatrização ocorre por primeira intenção e após 11 dias da extração, o epitélio recobre e o tecido de granulação preenche o alvéolo, com a produção de fibras de colágeno bastante evidente.
- III. A cicatrização ocorre por segunda intenção e, após 24 horas da extração do dente, encontra-se preenchido por coágulo, formado por malha de fibrina.
- a) I e III estão corretas.
b) Somente a I está correta.
c) Somente a II está correta.
d) Somente a III está correta.

34. Doenças virais na região perioral e mucosa oral podem ser encontradas com frequência durante o exercício da odontologia, sendo necessário o profissional estar preparado para identificá-las e orientar o tratamento. Sobre as infecções por vírus relacionadas à odontologia, assinale a alternativa incorreta:

- a) Papiloma é uma neoplasia benigna causada pela infecção por HPV e se caracteriza por ser lesão assintomática, de forma verrucosa, apresentando aspecto de “couve-flor”.
- b) A gengivoestomatite herpética é a manifestação clínica mais comum de uma infecção primária causada pelo HPV na boca, onde aparecem

- úlceras rasas na gengiva inserida e nas mucosas jugal e sublingual, além da mucosa do palato duro.
- c) O vírus espstein-barr (EBV) é conhecido por causar o desenvolvimento de neoplasias. Este vírus está associado com várias formas de linfomas e carcinomas nasofaríngeano
- d) Os vírus são importantes agentes causadores de úlceras e podem estar envolvidos no processo de tumorigênese de algumas neoplasias na cavidade oral.

35. Paciente, sexo masculino, 25 anos, compareceu ao consultório odontológico para exodontia do elemento 38. Ao exame radiográfico, observou-se dente incluso/impactado e uma área radiolúcida com limites bem definidos na região da coroa. Solicitados exames histopatológicos, foi observado a presença de uma cápsula conjuntiva revestida por epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado. Com base nos achados, podemos afirmar que o caso se trata de:

- a) Queratocisto odontogênico.
b) Cisto Dentígero.
c) Ameloblastoma.
d) Carcinoma ameloblástico.

36. De acordo com Cervera-Espert, et al., (2016), a lesão do Nervo Alveolar Inferior (NAI) é uma complicação rara, mas séria, da extração do terceiro molar inferior. Para o autor, a lesão iatrogênica do NAI durante a remoção dos terceiros molares inferiores é um problema clínico e médico-legal. Para evitar tal complicação, o cirurgião-dentista deve:

- I. Realizar um planejamento minucioso da cirurgia com auxílio de exames de imagem, como a radiografia panorâmica ou tomografia, além de ser conservador e realizar a ostectomia na região distal e disto-lingual com peça de baixa rotação sob irrigação abundante.
- II. Realizar um planejamento minucioso da cirurgia com auxílio de exames de imagem, como a radiografia panorâmica ou tomografia, além de ser conservador e realizar a ostectomia na região vestibular e mesial, com peça de baixa rotação sob irrigação abundante.
- III. Realizar um planejamento minucioso da cirurgia com auxílio de exames de imagem, como a radiografia panorâmica ou tomografia, e quando houver risco de lesionar o NAI pelo intimo contato da raiz, realizar a coronectomia para prevenir a lesão neurosensitiva observando se a necessidade de futura reoperação ou realização



de um canal radicular simultaneamente à coronectomia.

- a) I, II, III estão corretas.
- b) II e III estão corretas.
- c) I e III estão corretas.
- d) Somente a I está correta.

37. O controle de comportamento infantil é indispensável na prática da Odontopediatria. Uma das manobras para cooperação do paciente pediátrico e sucesso do tratamento seria de explicar à criança o que será feito antes de iniciar o procedimento e mostrar através de algum tipo de simulação o que vai ocorrer. Utilizar um vocabulário substituto para os elementos do consultório odontológico e procedimentos em que a criança possa entender, além de apresentar aos poucos, oferecendo-lhes explicações verbais, numa linguagem simples, envolvendo demonstrações visuais, auditivas, táteis e olfatórias dos mesmos procedimentos.

A manobra descrita acima corresponde a qual técnica de controle de comportamento odontopediátrico?

- a) Técnica da Mão sobre a boca.
- b) Técnica do controle pela voz.
- c) Técnica do gerenciamento da comunicação.
- d) Técnica do falar-mostrar-fazer (Tell-show-do - TSD).

38. O objetivo do tratamento endodôntico é a manutenção do elemento dental em função no sistema estomatognático, sem prejuízos à saúde do paciente. O sucesso do tratamento endodôntico se caracteriza pelo alcance de quais desses fatores?

- I. Silêncio clínico (ausência de dor, edema, fístula)
 - II. Estrutura óssea periapical normal (uniformidade da lâmina dura, espaço periodontal normal, ausência ou redução de rarefação óssea, ausência ou interrupção de reabsorção radicular)
 - III. Dente em função e presença de selamento coronário perfeito
 - IV. Melhor taxa de sucesso em dentes que estão vitais ao invés de dentes que já tiveram uma necrose pulpar.
- a) I, II e III.
 - b) I, III e IV.
 - c) I e III.
 - d) Todas estão corretas.

39. Uma das causas dos insucessos do tratamento endodôntico está relacionada à função de situações inerentes ao dente ou a alguma iatrogenia. Dessa forma, marque a alternativa

correta em que está relacionada ao fracasso do tratamento endodôntico:

- a) As reabsorções apicais modificam a anatomia do ápice dental. A obturação do canal nesses casos, seja cone ou cimento, se invadir a área da reabsorção irá criar mecanismos para o início do reparo.
- b) Calcificações da câmara pulpar e nódulos pulpares, dependendo do tamanho e da localização, podem dificultar e/ou impossibilitar o correto acesso ao canal, levando ao preparo e desinfecção deficientes, comprometendo o sucesso do tratamento.
- c) Baixa qualidade das restaurações e microinfiltrações na coroa dentária não influencia no insucesso do tratamento endodôntico pois, quando bem obturado, não é possível de recontaminação.
- d) Falhas ocorridas na adaptação da contenção com pinos intrarradiculares em relação ao seu comprimento que devem preservar no mínimo 2,0mm de guta percha residual após o preparo do espaço do pino intrarradicular.

40. Em uma reabilitação com prótese total, para que se alcance o prognóstico favorável, se faz necessário um planejamento prévio através do exame clínico bucal e radiográfico para evitar circunstâncias desfavoráveis encobertas pelas mucosas. Dessa forma, marque a alternativa correta para que tenhamos um prognóstico favorável na reabilitação com prótese total:

- a) Bom domínio muscular, relação normal entre os rebordos, mucosa isenta de lesões e patologias, relação angular do palato não abrupta, além de habilidades técnicas do dentista.
- b) Bom domínio muscular, posição normal da língua, reabsorção não excessiva, xerostomia, relação normal entre os rebordos, além de habilidades técnicas do dentista.
- c) Bom domínio muscular, mucosa isenta de lesões e patologias, reabsorção excessiva, saliva serosa, relação normal entre os rebordos, além de habilidades técnicas do dentista.
- d) Boa relação lábio-alveolar, relação anormal entre os rebordos, reabsorção excessiva, saliva mucosa, relação normal entre os rebordos, além do profissional sem experiência, uma vez que o processo de moldagem é simples.